**MINISTERUL SANATATII**
**COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDE**
**MINISTRY OF HEALTH**
**NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS**

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA
Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22

Data emiterii: 07.08.2026

# AVIZ
# Nr. 5634BIO/02/01.27

În conformitate cu Ordinul Ministrului Sănătăţii, al Ministrului Mediului şi Pădurilor şi al presedintelui Autorităţii Nationale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 10/368/11/2010, privind aprobarea procedurii de avizare a produselor biocide care sunt plasate pe teritoriul Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare si cu Ordinul Ministrului Sanatatii, al Ministrului Mediului si Padurilor si al Presedintelui Autoritatii Nationale Sanitar Veterinare si Siguranta Alimentului nr. 637/2492/50/2012, privind aprobarea membrilor Comisiei Nationale pentru Produse Biocide si a regulamentului de organizare si functionare a acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare, in baza documentelor depuse in dosarul tehnic, CNPB, in sedinţa din data de **10.05.2021, 07.07.2021, 07.09.2021, 30.09.2021, 20.01.2022, 26.07.2022, 13.09.2022, 16.12.2022, 13.02.2023, 24.03.2023, 15.06.2023, 07.09.2023, 20.03.2024, 12.06.2024, 14.11.2024 si 03.06.2026** a decis ca produsul biocid poate fi plasat pe piaţă în România, conform prevederilor legale in vigoare.

**I. DENUMIREA COMERCIALĂ ÎN ROMÂNIA**

| |
|---|
| **PEROKLIN** |

**Alte denumiri comerciale, după caz**

| |
|---|
| **NEBULOKLIN; KLINALL DEZINFECTANT AEROMICROFLORA; DESOGEN AERO** |
| CNPB inscrie denumirile comerciale conform solicitarii detinatorului de aviz si nu isi asuma responsabilitatea cu privire la aspectele comerciale, concurentiale sau de proprietate intelectuala. |

**II. DATE DE IDENTIFICARE ALE PRODUCĂTORULUI** (numele, adresa, ţara,inclusiv punctul de lucru pentru producatorii din Romania)

| |
|---|
| **KLINTENSIV S.R.L.** Sos. Alexandriei nr. 544, km. 14, hala C 34 A, 07025, Bragadiru, jud. Ilfov; Romania<br>**Punct de lucru:** Sos. Alexandriei nr. 544, km. 14, hala C 34 A, 07025, Bragadiru, jud. Ilfov |

**III. DATE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTULUI** (numele, adresa, ţara)

| |
|---|
| **KLINTENSIV S.R.L.** Sos. Alexandriei nr. 544, km. 14, hala C 34 A, 07025, Bragadiru, jud. Ilfov, Romania |

**IV. ÎNCADRAREA PRODUSULUI BIOCID** (în conformitate cu anexa V la Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor biocide, cu amendamentele ulterioare)

| | |
|---|---|
| A. Grupa principală: | 1 |
| B. Tipul/Tipurile de produs: | 2 |

**V. DATE PRIVIND SUBSTANŢA ACTIVĂ / SUBSTANŢE**

**A. Substanţe chimice**

| Nr. crt. | Denumirea chimică (IUPAC, ISO sau altele) | Nr. CE | Nr. CAS | Concentraţia în unităţi metrice |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hydrogen peroxide | 231-765-0 | 7722-84-1 | 6 % (m/m) |
| 2. | Didecyldimethylammonium chloride | 230-525-2 | 7173-51-5 | 0,35 % (m/m) |

## VI. FORMA DE CONDIŢIONARE:

Lichid.

## VII. MODUL DE AMBALARE (tipul, capacitate)

Utilizatori populatie si profesionali: Ambalaje din material plastic opac 0,5 L; 0,700 L; 0,750 L; 1 L; bidoane din material plastic opac de 1,5 L, 2 L, 3 L; canistre din material plastic de 5 L, 10 L,
Utilizatori profesionali: canistre din material plastic de 20L.

## VIII. DOMENIUL ŞI ARIA DE UTILIZARE

| | |
|---|---|
| A. Domeniul de utilizare | Dezinfectante si algicide care nu sunt destinate aplicarii directe la oameni sau animale |
| B. Aria de aplicare | Dezinfecția suprafețelor dure, instrumentarului/dispozitivelor medicale din unitățile sanitare, respectiv suprafețelor din domeniul industrial, public si privat. Dezinfectarea suprafețelor camerelor pe cale aeriană. |

## IX. EFICACITATE

| Activitatea | Metoda de testare/ Protocolul de testare | Specia / Tulpina | Concentraţii | Timpi de acţiune |
|---|---|---|---|---|
| ***Dezinfectia in unitatile sanitare*** | | | | |
| Bactericida[2] | EN 13727+ A2:2015-12 (conditii de murdarie 3g/L albumina bovina 3 mL/L eritrocite) | *Pseudomonas aeruginosa* ATCC 15442<br>*Staphylococcus aureus* ATCC 6538<br>*Enterococcus hirae* ATCC 10541<br>*Escherichia coli* K12 NCTC 10538 | 30%<br>50%<br>80% | 2 minute |
| Bactericidă[9] | EN 13727+A2:2015-12 (condiții de murdărie 3,0 g/l albumină bovină + 3,0 ml/l eritrocite de oaie) | *Klebsiella pneumoniae* BAA 1705<br>*Acinetobacter baumanii* BAA 1605 | 30%<br>50%<br>80% | 3 min |
| Bactericida | EN 1276: 2019 Standard) Faza 2/Etapa1 (conditii de murdarie 3g/L albumina bovina) | *Pseudomonas aeruginosa* (CECT 116 = ATCC 15442).<br>*Escherichia coli* (CECT 405 = ATCC 10536).<br>*Staphylococcus aureus* (CECT 239 = ATCC 6538).<br>*Enterococcus hirae* (CECT 4081 = ATCC 10541) | 20%<br>30% | 5 minute |
| Fungicida[2] | EN 13624:2013-12 (conditii de murdarie 3g/L albumina bovina 3 mL/L eritrocite) | *Aspergillus brasiliensis* ATCC 16404 | 80%<br>97% | 3 minute |
| | | *Candida albicans* ATCC 10231 | 50%<br>80%<br>97% | 3 minute |
| Levuricidă[2] | EN 13624, în condiții de curățenie (0.3 g/L albumină bovină) | *Candida albicans* ATCC 10231 | ≥ 20 % | 5 minute |
| Levuricidă[9] | EN 13624:2022-04 (condiții de murdărie 3,0 g/l albumină bovină + 3,0 ml/l eritrocite de oaie) | *Candida auris* 01256P derivată din CDC B11903 | 30%<br>50%<br>80% | 3 min |

ROMANIA Comisia Națională pentru Produse Biocide MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

## IX. EFICACITATE

| Activitatea | Metoda de testare/ Protocolul de testare | Specia / Tulpina | Concentraţii | Timpi de acţiune |
|---|---|---|---|---|
| ***Dezinfectia in unitatile sanitare*** | | | | |
| Fungicida | EN 1650:2019-12 (conditii de murdarie 3g/L albumina bovina) | *Candida albicans* ATCC 10231 | 10% | 5 minute |
| | | *Aspergillus brasiliensis* ATCC 16404 | 20% | |
| Bactericida[2] | EN 14561: 2007 Standard Faza 2/Etapa2 (conditii de murdarie 3g/L albumina bovina 3 mL/L eritrocite) | *Pseudomonas aeruginosa* (CECT 116 = ATCC 15442). *Staphylococcus aureus* (CECT 239 = ATCC 6538). *Enterococcus hirae* (CECT 4081 = ATCC 10541) | 80% | 10 minute |
| Levuricida[2] | EN 14562: 2007 Standard Faza 2/Etapa2 (conditii de murdarie 3g/L albumina bovina 3 mL/L eritrocite) | *Candida albicans* (CECT 1394 = ATCC 10231) | 80% | 10 minute |
| Levuricida/ Fungicida[2] | EN 14562: 2007 Standard Faza 2/Etapa2 (conditii de murdarie 3g/L albumina bovina 3 mL/L eritrocite) | *Aspergillus brasiliensis* (CECT 2574 = ATCC 16404) *Candida albicans* (CECT 1394 = ATCC 10231) | 100% | 10 minute |
| Virucida contra virusuri anvelopate[2] | EN14476: 2013 + A2: 2019 Standard (conditii de murdarie 3g/L albumina bovina 3 mL/L eritrocite) | *Vaccinia virus* tulpina Ankara modificata (MVA) ATCC VR-1508 | 30% | 1 minut |
| Inactivare virus[1] | EN 14476:2013+ A2:2019 (conditii de curatenie 0.3g/l sol. albumina bovina) | *Poliovirus tip 1* ATCC VR-192 *Murine Norovirus (strain S99 Berlin)* | 80% (v/v) | 5 minute |
| Virucida[3] | EN 16777: 2019 Standard Faza 2/Etapa2 (conditii de curatenie 0.3g/L albumina bovina) | *Adenovirus tip 5* (ATCC VR-5) *Murine Norovirus* (tulpina S99 Berlin) | 100% | 5 minute |
| Micobactericida/ Tuberculocida [1] | EN 14348:2005 conditii de curatenie (0,3 g/l sol. albumina bovina) | *Mycobacterium avium ATCC 15769* *Mycobacterium terrae ATCC 15755* | 80% (v/v) | 60 minute |

## AVIZ Nr. 5634BIO/02/01.27

### IX. EFICACITATE

| Activitatea | Metoda de testare/ Protocolul de testare | *Specia / Tulpina* | Concentraţii | Timpi de acţiune |
|---|---|---|---|---|
| ***Dezinfectia in unitatile sanitare*** | | | | |
| Bactericida[4] | EN 17387: 2021 Standard Faza 2/ Etapa2 (conditii de murdarie 3g/l albumina bovina si 3ml/l eritrocite) | *Pseudomonas aeruginosa* (CECT 116 = ATCC 15442) *Staphylococcus aureus* (CECT 239 = ATCC 6538) *Enterococcus hirae* (CECT 4081 = ATCC 10541) | 50% | 3 minute |
| Levuricida/ Fungicida[4] | EN 17387: 2021 Standard Faza 2/ Etapa2 (conditii de murdarie 3g/l albumina bovina si 3ml/l eritrocite) | *Aspergillus brasiliensis* (CECT 2574 = ATCC 16404) *Candida albicans* (CECT 1394 = ATCC 10231) | 100% | 3 minute |
| | | *Candida albicans* (CECT 1394 = ATCC 10231) | 80% | 3 minute |
| Virucida[4] | EN 17111: 2018 Standard Faza 2/ Etapa2 (conditii de murdarie 3g/l albumina bovina si 3ml/l eritrocite) | *Adenovirus tip 5* ATCC VR-5 *Murine norovirus* (tulpina S99 Berlin) | 100% | 8 minute |
| Bactericida Levuricida Fungicida Micobactericida Tuberculocida Virucida[4] **Sporicida[5]** | EN 17272: 2020 (conditii de curatenie 0.3g/l albumina bovina) | *Escherichia coli ATCC 10536* *Staphylococcus aureus ATCC 6538* *Acinetobacter baumannii ATCC 19606* *Enterococcus hirae ATCC 10541* | 100% 10 mL/m$^3$ | 30 minute |
| | | *Aspergillus brasiliensis ATCC 16404* *Candida albicans ATCC 10231* | 100% 10 mL/m$^3$ | 30 minute |
| | | *Mycobacterium avium ATCC 15769* *Mycobacterium terrae ATCC 15755* | 100% 10 mL/m$^3$ | 30 minute |
| | | *Adenovirus tip 5 ATCC VR-5* *Murine norovirus tulpina S99 ATCC TIB-71* | 100% 10 mL/m$^3$ | 30 minute |
| | | ***Bacillus subtilis* ATCC 6633** ***Bacillus cereus* ATCC 14579** ***Clostridiodes difficile ATCC 9689*** | 100% 10 mL/m$^3$ | 30 min |
| Obs.: Vaporizarea produsului Peroklin s-a realizat cu dipozitivul CUBE M care necesitat un timp de difuzie de 5 min si un timp de actiune de 30 de minute. | | | | |
| Sporicida[5] | **EN 17126 (2018)** Faza 2/ Etapa1 (conditii de curatenie 0.3g/l albumina bovina) | *Bacillus spizizenii (fost subtilis) ATCC 6633* *Bacillus cereus CIP 105151* | 80% | 20 min |
| Micobactericida/ Tuberculocida[6] | **EN 14563: 2008 Standard** Faza 2/ Etapa2 (conditii de murdarie 3g/l albumina bovina si 3 ml/l eritrocite) | *Mycobacterium avium* (ATCC 15769) *Mycobacterium terrae* (CECT 3028 = ATCC 15755) | pur (100%) | 40 min |

## IX. EFICACITATE

| Activitatea | Metoda de testare/ Protocolul de testare | *Specia / Tulpina* | Concentraţii | Timpi de acţiune |
|---|---|---|---|---|
| ***Dezinfectia in unitatile sanitare*** | | | | |
| Sporicida[6] | **EN 16615: 2015 Standard** Faza 2/ Etapa2 (conditii de murdarie 3g/l albumina bovina si 3 ml/l eritrocite) | *Bacillus subtilis* (CECT 356 = ATCC 6633 | pur | 25 min. |
| Bactericida/ Levuricida[6] | **EN 16615: 2015 Standard** Faza 2/ Etapa2 (conditii de murdarie 3g/l albumina bovina si 3 ml/l eritrocite) | *Pseudomonas aeruginosa* (CECT 116 = ATCC 15442) *Staphylococcus aureus* (CECT 239 = ATCC 6538) *Enterococcus hirae* (CECT 4081 = ATCC 10541) *Candida albicans* (CECT 1394 = ATCC 10231). | 70% | 3 min |
| Fungicida[6] | **EN 16615: 2015 Standard** Faza 2/ Etapa2 (conditii de murdarie 3g/l albumina bovina si 3 ml/l eritrocite) | *Aspergillus brasiliensis* CECT 2574 = ATCC 16404 | pur (100%) | 3 min |
| Tuberculocida[6] | **EN 16615: 2015 Standard** Faza 2/ Etapa2 (conditii de murdarie 3g/l albumina bovina si 3 ml/l eritrocite) | *Mycobacterium terrae* (CECT 3028 = ATCC 15755) | pur (100%) | 60 min |
| Micobactericidă/ Tuberculocidă[7] | EN 14348: 2005 Standard Faza 2/Etapa1 (condiții de murdărie 3g/L albumină bovina și 3mL/L eritrocite) | *Mycobacterium avium* (ATCC 15769) *Mycobacterium terrae* (CECT 3028 = ATCC 15755) | 80% | 40 min |
| Virucidă[7] | EN 14476: 2013 + A2: 2019 Standard Faza 2/Etapa1 (condiții de murdărie 3g/L albumină bovina și 3mL/L eritrocite) | *Poliovirus tip 1* ATCC VR-192 *Adenovirus tip 5* ATCC VR-5 *Murine Norovirus* tulpina S99 Berlin | 80% | 5 min |
| Virucidă impotriva virusurilor anvelopate, *Norovirus*, *Rotavirus* și *Adenovirus*[7] | EN 14476: 2013 + A2: 2019 Standard Faza 2/Etapa1 (condiții de murdărie 3g/L albumină bovina și 3mL/L eritrocite) | *Adenovirus tip 5* ATCC VR-5 *Murine Norovirus* tulpina S99 Berlin | 50% | |

# AVIZ Nr. 5634BIO/02/01.27

## IX. EFICACITATE

| Activitatea | Metoda de testare/ Protocolul de testare | *Specia / Tulpina* | Concentraţii | Timpul de acţiune |
|---|---|---|---|---|
| ***Dezinfectia in unitatile sanitare*** | | | | |
| Virucidă[7] | EN 16777: 2018 Standard) Faza 2/Etapa2 (condiții de murdărie 3g/L albumină bovina și 3mL/L eritrocite) | *Adenovirus tip 5* ATCC VR-5 *Murine Norovirus* tulpina S99 Berlin | 100% | 5 min |
| Sporicidă[7] | EN 17126 : 2018 Standard Faza 2/Etapa1 (condiții de murdărie 3g/L albumină bovina și 3mL/L eritrocite) | *Bacillus subtilis* ATCC 6633 – *Bacillus cereus* CIP 105151 | 80% | 60 min |
| Sporicidă[8] | EN 17126 : 2018 Faza 2/Etapa1 (condiții de murdărie 3g/L albumină bovină și 3mL/L eritrocite) | *Clostridium difficile* R027 (NCTC 13366). | 80% | 50 min |
| ***Dezinfectia in unitati publice si private altele decat cele sanitare. Teste aditionale fata de cele inscrise la capitolul "Dezinfectia in unitatile sanitare"*** | | | | |
| Bactericidă | EN 13697, în condiții de curățenie (0.3 g/L albumină bovină) | *Staphylococcus aureus ATCC 33592 (MRSA)* | 80 % v/v<br>100 % v/v | 5 minute |
| Bactericida | EN 13697: 2015 + A1: 2019 Standard Faza 2/Etapa2 (conditii de murdarie 3g/L albumina bovina) | *Pseudomonas aeruginosa* (CECT 116 = ATCC 15442)<br>*Escherichia coli* (CECT 405 = ATCC 10536)<br>*Staphylococcus aureus* (CECT 239 = ATCC 6538)<br>*Enterococcus hirae* (CECT 4081 = ATCC 10541). | 50%<br>80% | 3 minute |
| Bactericidă | EN 13697, în condiții de curățenie (0.3 g/L albumină bovină) | *Pseudomonas aeruginosa* ATCC 15442<br>*Staphylococcus aureus* ATCC 6538<br>*Escherichia coli* ATCC 10536<br>*Enterococcus hirae* ATCC 10541 | ≥ 20 % | 5 minute |
| Fungicida | EN 13697+A1:2019-08 (conditii de murdarie 3g/L albumina bovina 3 mL/L eritrocite) | *Aspergillus brasiliensis* ATCC 16404 | 80%<br>97% | 3 minute |
| | | *Candida albicans* ATCC 10231 | 50%<br>80%<br>97% | |
| Fungicidă | EN 13697, în condiții de curățenie (0,3 g/L albumină bovină) | *Candida albicans* ATCC 10231<br>*Aspergillus brasiliensis* ATCC 16404 | ≥ 50 % | 60 minute |
| Levuricidă | EN 13697, în condiții de curățenie (0.3 g/L albumină bovină) | *Candida albicans* ATCC 10231 | ≥ 20 % | 5 minute |

# AVIZ Nr. 5634BIO/02/01.27

## IX. EFICACITATE

| Activitatea | Metoda de testare/ Protocolul de testare | *Specia / Tulpina* | Concentraţii | Timpi de acţiune |
|---|---|---|---|---|
| ***Dezinfectia in unitati publice si private altele decat cele sanitare. Teste aditionale fata de cele inscrise la capitolul "Dezinfectia in unitatile sanitare"*** | | | | |
| Sporicida | EN 13704 (2018) Faza 2/ Etapa1 (conditii de curatenie 0.3g/l albumina bovina) | *Bacillus subtilis* ATCC 6633 | 97%<br>20% | 15 minute |

## X. INDICAŢII DE UTILIZARE

| Metoda de aplicare | Concentraţia soluţiei de lucru/ doza de aplicare | Timpul de acţiune |
|---|---|---|
| Dezinfectarea suprafețelor prin: ștergere, pulverizare | Activitate bactericidă: 30% | 2 minute |
| | Activitate levuricidă: 20% | 5 minute |
| | 50% | 3 minute |
| | Activitate fungicidă: 80% | 3 minute |
| | Activitate virucidă generala: 80% | 5 minute |
| | limitata: 30% | 1 minut |
| | Activitate micobactericidă/tuberculocidă: 80% | 60 minute |
| | Activitate sporicidă: 20% | 15 minute |
| Dezinfectarea camerelor pe cale aeriană prin: nebulizare | Activitate: bactericidă, levuricidă, fungicidă, micobactericidă, tuberculocidă, virucidă, sporicida. 100%/ 10ml/$m^3$ | 30 min timp de tratare |
| Dezinfectarea instrumentarului/ dispozitivelor medicale prin: imersie, umplere, ștergere | Activitate: bactericidă, levuricidă, fungicidă, virucidă. 100%/ imersie totala | 10 minute |
| | Activitate sporicidă: 80%/ imersie totala | 20 minute |
| | Activitate micobactericida, tuberculocida 100%/ imersie totala | 40 minute |
| - prin pulverizare convențională cu pulverizator tip trigger: 8-14 ml/ $m^2$ - funcție de gradul de luciu al suprafețelor pe care se aplică;<br>- prin pulverizare electrostatică: 4,5 - 7 ml/$m^2$ - funcție de dimensiunea aleasă a particulelor prin setarea duzei pulverizatorului și de performanța aparatului utilizat. | | |

## XI. ETICHETAREA PRODUSULUI BIOCID

Produs biocid cu substante active - substante chimice

| | |
|---|---|
| Pictograme,simboluri si indicarea pericolului |  GHS07 Atentie |
| Fraze de risc (H) | H319 – Provoacă o iritare gravă a ochilor. |
| Fraze de prudenta (P) | P101: Dacă este necesară consultarea medicului, ţineţi la îndemână recipientul sau eticheta produsului.<br>P102 – A nu se lăsa la îndemâna copiilor.<br>P264: Spălaţi-vă bine după utilizare.<br>P280 – Purtaţi mănuşi de protecţie/ îmbrăcăminte de protecţie/ echipament de protecţie a ochilor/ echipament de protecţie a feţei.<br>P305 + P351 + P338 - ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.<br>P337 + P313 – Dacă iritarea ochilor persistă: consultaţi medicul.<br>P501 – Aruncaţi conţinutul/ recipientul la o unitate autorizată pentru colectarea deșeurilor. |

# AVIZ Nr. 5634BIO/02/01.27

## XII. CATEGORIA DE UTILIZATORI

Populatie, profesionali, industriali.

## XIII. RECOMANDARI/ RESTRICTII PRIVIND PROTECTIA SANATATII SI A FACTORILOR DE MEDIU

-

Avizul este valabil până la data: **31.01.2027.**

Indicatia de utilizare in unitati sanitare este valabila pana la data de **03.08.2027**, cu urmatoarele precizari:

[1] Eficacitatea inactivare virus conform EN 14476 si Micobactericida/Tuberculocida conform EN 14348 este valabila pana la data de **22.10.2026.**

[2]Eficacitatea Bactericida conform EN 14561:2007, EN 13727+ A2:2015-12, Levuricida/fungicida conform EN 14562: 2007, EN 13624:2013-12 si Virucida contra virusuri anvelopate conform EN14476:2013 + A2:2019 este valabila pana la data de **03.08.2027**.

[3]Eficacitatea virucida EN 16777: 2019 este valabila pana la data de **19.09.2027.**

[4]Eficacitatea Bactericida EN 17387: 2021, Levuricida/ Fungicida EN 17387: 2021, Virucida EN 17111: 2018, Bactericida, Levuricida, Fungicida, Micobactericida, Tuberculocida, Virucida EN 17272: 2020 sunt valabile pana la data de **21.12.2027.**

[5]Eficacitatea sporicida **EN 17216(2018)** si Sporicida **EN 17272: 2020** sunt valabile pana la data **20.02.2028**.

[6]Eficacitatile Micobactericida/Tuberculocida **EN 14563: 2008,** Sporicida **EN 16615:2015 Standard,** Bactericida/ Levuricida **EN 16615: 2015 Standard,** Fungicida, **EN 16615: 2015 Standard**, Tuberculocida **EN 16615: 2015 Standard** sunt valabile pana la data **20.02.2028**.

[7]Eficacitatea Micobactericidă/Tuberculocidă EN 14348:2005 Standard Faza 2/Etapa1, Virucidă si Virucidă impotriva virusurilor anvelopate, *Norovirus*, *Rotavirus* și *Adenovirus* EN 14476:2013 + A2: 2019 Standard Faza 2/Etapa1, Virucidă EN 16777:2018 Standard Faza 2/Etapa2 si Sporicidă EN 17126:2018 Standard Faza 2/Etapa1 sunt valabile pana la data **14.09.2028**.

[8]Eficacitatea Sporicidă EN 17126 : 2018 este valabila pana la data **10.04.2029**.

[9]Eficacitatea Levuricidă EN 13624:2022-04 si Bactericidă EN 13727+A2:2015-12 este valabila pana la data **19.06.2029**.

Avizul conţine – 8 pagini.

Avizul a fost rescris in data de 07.08.2026.

PREŞEDINTE
Dr. Chim. Gabriela Călinoiu

ROMÂNIA
Comisia Națională pentru Produse Biocide
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

Redactat: Ana-Maria Oancea