MINISTERUL SANATATII
COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDE
MINISTRY OF HEALTH
NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS
Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA
Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22

Data emiterii: 06.08.2026

AVIZ
Nr. 6330BIO/02/12.30

În conformitate cu Ordinul Ministrului Sănătăţii, al Ministrului Mediului şi Pădurilor şi al presedintelui Autorităţii Nationale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 10/368/11/2010, privind aprobarea procedurii de avizare a produselor biocide care sunt plasate pe teritoriul Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare si cu Ordinul Ministrului Sanatatii, al Ministrului Mediului si Padurilor si al Presedintelui Autoritatii Nationale Sanitar Veterinare si Siguranta Alimentului nr. 637/2492/50/2012, privind aprobarea membrilor Comisiei Nationale pentru Produse Bicide si a regulamentului de organizare si functionare a acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare, in baza documentelor depuse in dosarul tehnic, CNPB in sedinţele din datele de 24.03.2023, 15.06.2023, 27.04.2026 si 15.07.2026 s-a decis ca produsul biocid poate fi plasat pe piaţă în România, conform prevederilor legale in vigoare

I. DENUMIREA COMERCIALĂ ÎN ROMÂNIA

DEZIDIOL SPRAY

Alte denumiri comerciale, după caz

Klintensiv Alchosafe; KLINO Quick disinfectant
CNPB inscrie denumirile comerciale conform solicitarii detinatorului de aviz si nu isi asuma responsabilitatea cu privire la aspectele comerciale, concurentiale sau de proprietate intelectuala.

II. DATE DE IDENTIFICARE ALE PRODUCĂTORULUI (numele, adresa, ţara, inclusiv punctul de lucru pentru producatorii din Romania)

Klintensiv SRL, Sos. Alexandriei, nr. 544, km.14, hala C34, oras Bragadiru, jud. Ilfov, Romania Punct de lucru: sos. Alexandriei, nr. 544, Incinta FNC SABARU, Bragadiru, jud. Ilfov, Romania

III. DATE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTULUI (numele, adresa, ţara)

Klintensiv SRL, Sos. Alexandriei, nr. 544, km.14, hala C34, oras Bragadiru, jud. Ilfov, Romania

IV. ÎNCADRAREA PRODUSULUI BIOCID (în conformitate cu anexa V la Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor biocide, cu amendamentele ulterioare)

A. Grupa principală:	1
B. Tipul/Tipurile de produs:	2

V. DATE PRIVIND SUBSTANŢA ACTIVĂ / SUBSTANŢE

A. Substanţe chimice

Nr. crt.	Denumirea chimică (IUPAC, ISO sau altele)	Nr. CE	Nr. CAS	Concentraţia în unităţi metrice
1.	Etanol	200-578-6	64-17-5	36% (m/m)
2.	Izopropanol	200-661-7	67-63-0	24% (m/m)
3.	Digluconat de clorhexidină	242-354-0	18472-51-0	0,5% (m/m)

AVIZ Nr. 6330BIO/02/12.30

VI. FORMA DE CONDIŢIONARE:

Lichid

VII. MODUL DE AMBALARE (tipul, capacitate)

Populatie si profesionali: recipiente din material plastic cu volume: 0,5L, 0,7L, 0,75L, 1L, 1,5L, 2L, 3L, 5L, 10L;
Profesionali: 20L.

VIII. DOMENIUL ŞI ARIA DE UTILIZARE

A. Domeniul de utilizare	Dezinfectante și algicide care nu sunt destinate aplicării directe la oameni sau animale.
B. Aria de aplicare	Dezinfectarea prin ștergere a suprafețelor și a microflorei depuse pe suprafețele din unități sanitare, laboratoare medicale, instituții publice și private precum și cele din domeniul casnic. Dezinfectarea suprafețelor dure în industria farmaceutică și cosmetică.

IX. EFICACITATE

Activitatea	Metoda de testare/ protocolul de testare	Specia/tulpina	Concentratii	Timp de actiune
Dezinfectia in unitatile sanitare				
Bactericidă (inclusiv împotriva *Staphylococcus aureus rezistent la meticilină - MRSA)*	PN-EN 13727+A2:2015 condiții de murdărie (3,0 g/l albumină bovină + 3,0 ml/l eritrocite ovine), 20°C	*Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442* *Staphylococcus aureus ATCC 6538* *Enterococcus hirae ATCC 10541* *Escherichia coli K12 NCTC 10538* *Staphylococcus aureus ATCC 33592 (MRSA)*	70 % (v/v)	30 secunde
Bactericidă	EN 13697:2015 + A1: 2019 condiții de murdărie (3,0 g/l albumină bovină serică), 20°C	*Pseudomonas aeruginosa (CECT 116 = ATCC 15442)* *Escherichia coli (CECT 405 = ATCC 10536)* *Staphylococcus aureus (CECT 239 = ATCC 6538)* *Enterococcus hirae (CECT 4081 = ATCC 10541)*	100 % (v/v)	30 secunde
Bactericidă[1]	EN 14561:2006 Faza2/Etapa2 (condiții murdarie 3g/l BSA și 3ml/l eritrocite ovine)	*Pseudomonas aeruginosa* ATCC 15442 *Staphylococcus aureus* ATCC 6538 *Enterococcus hirae* ATCC 10541	100%	2 min
Bactericidă și Levuricidă	EN 16615: 2015 condiții de murdărie (3,0 g/l albumină serică bovină + 3,0 ml/l eritrocite), 20°C	*Pseudomonas aeruginosa (CECT 116 = ATCC 15442)* *Staphylococcus aureus (CECT 239 = ATCC 6538)* *Enterococcus hirae (CECT 4081 = ATCC 10541)* *Candida albicans (CECT 1394 = ATCC 10231)*	100% (v/v)	3 minute
Levuricidă	PN-EN 13624:2013 condiții de murdărie (3,0 g/l albumină bovină + 3,0 ml/l eritrocite ovine), 20°C	*Candida albicans ATCC 10231*	70 % (v/v)	30 secunde

IX. EFICACITATE

Activitatea	Metoda de testare/ protocolul de testare	Specia/tulpina	Concentratii	Timp de actiune
Dezinfectia in unitatile sanitare				
Fungicidă	PN-EN 13624:2013 condiții de murdărie (3,0 g/l albumină bovină + 3,0 ml/l eritrocite ovine), 20°C	*Aspergillus brasiliensis ATCC 16404*	80 % (v/v)	90 secunde
Levuricida[1]	EN 13624:2021 Faza2/Etapa1 (condiții murdarie 3g/l BSA și 3ml/l eritrocite ovine)	*Candida auris* DSM 21092	80%	1 min
Levuricidă	PN-EN 13697+A1:2019 condiții de murdărie (3,0 g/l albumină bovină), 20°C	*Candida albicans ATCC 10231*	90 % (v/v)	30 secunde
Fungicidă	PN-EN 13697+A1:2019 condiții de murdărie (3,0 g/l albumină bovină), 20°C	*Aspergillus brasiliensis ATCC 16404*	100 % (v/v)	60 secunde
Levuricidă/ Fungicidă[1]	EN 14562:2006 Faza2/Etapa2 (condiții murdarie 3g/l BSA și 3ml/l eritrocite ovine)	*Candida albicans* ATCC 10231 *Aspergillus brasiliensis* ATCC 16404	100%	3 min
Virucidă	NF EN 14476: 2013 + A2: 2019 condiții de curățenie (0,3 g/l albumină serică bovină) 20°C	*Poliovirus tip 1 (ATCC VR-192)* *Adenovirus tip 5 (ATCC VR-5)* *Norovirus murin (tulpina S99 Berlin)*	80% (v/v)	2 minute
Virucidă cu spectru limitat *	NF EN 14476: 2013 + A2: 2019 condiții de curățenie (0,3 g/l albumină serică bovină) 20°C	*Adenovirus tip 5* (ATCC VR-5) *Norovirus murin* (tulpina S99 Berlin)	50% (v/v)	2 minute
Virucidă împotriva virusurilor anvelopate**	EN 14476: 2013 + A2: 2019 condiții de murdărie (3,0 g/l albumină serică bovină + 3,0 ml/l eritrocite), 20°C	*Virus Vaccinia, tulpina Vaccinia Ankara modificată (MVA)*	80% (v/v)	45 secunde
Inactivează virus[1]	EN 16777: 2018 Faza2/Etapa2 (condiții de murdărie 3g/L albumină serică bovină și 3 mL/L eritrocite)	Norovirus murin (tulpina S99 Berlin)	100%	2 min

IX. EFICACITATE

Activitatea	Metoda de testare/ protocolul de testare	Specia/tulpina	Concentratii	Timp de actiune
Dezinfectia in unitatile sanitare				
Inactivează virus[1]	EN 17111: 2018 Faza2/Etapa2 (condiții de murdărie 3g/L albumină serică bovină și 3 mL/L eritrocite)	Norovirus murin (tulpina S99 Berlin)	100%	2 min
Micobactericidă Tuberculocidă	EN 14348: 2005 condiții de curățenie (0,3 g/l albumină serică bovină) 20°C	*Mycobacterium terrae (CECT 3028 = ATCC 15755)* *Mycobacterium avium (ATCC 15769)*	80% (v/v)	1 minut
Dezinfectia in unitati publice si private altele decat cele sanitare. Teste aditionale fata de cele inscrise la capitolul "Dezinfectia in unitatile sanitare"				
Levuricidă Fungicidă	PN-EN 1650:2019 condiții de murdărie (3,0 g/l albumină bovină), 20°C	*Candida albicans ATCC 10231* *Aspergillus brasiliensis ATCC 16404*	70 % (v/v)	90 secunde
Bactericidă	EN 1276 condiții de curățenie (0,3 g/l albumină bovină), 20°C	*Staphylococcus aureus* ATCC 6538 *Pseudomonas aeruginosa* ATCC 15442 *Enterococcus hirae* ATCC 10541 *Escherichia coli* K12 NCTC 10538	100% (v/v)	30 secunde
Levuricidă	EN 1650 condiții de curățenie (0,3 g/l albumină bovină), 20°C	*Candida albicans* ATCC 10231	100% (v/v)	30 secunde

Observații:
* Produsul are eficacitate virucidă împotriva tuturor virusurilor anvelopate, conform Anexei A - Standardul EN 14476:2013 + A2: 2019: *Coronavirus, Filoviridae, Flavivirus, Hepatitis B virus (HBV), Hepatitis C virus (HCV), Hepatitis Delta virus (HDV), Herpesviridae, Human Immunodeficiency virus (HIV), Human T-cell lymphotropic virus (HTLV), Influenza virus, Measles virus, Paramyxoviridae, Poxviridae, Rabies virus, Rubella virus* (lista nu este exhaustivă), precum și eficacitate virucidă împotriva virusurilor: *Norovirus, Rotavirus* și *Adenovirus.*
** Produsul are eficacitate virucidă împotriva tuturor virusurilor anvelopate, conform Anexei A - Standardul EN 14476:2013 + A2: 2019: *Coronavirus, Filoviridae, Flavivirus, Hepatitis B virus (HBV), Hepatitis C virus (HCV), Hepatitis Delta virus (HDV), Herpesviridae, Human Immunodeficiency virus (HIV), Human T-cell lymphotropic virus (HTLV), Influenza virus, Measles virus, Paramyxoviridae, Poxviridae, Rabies virus, Rubella virus* (lista nu este exhaustivă).

X. INDICAŢII DE UTILIZARE

Metoda de aplicare	Concentraţia soluţiei de lucru/ doza de aplicare	Timpul de acţiune
Indicații în unități sanitare		
Ștergere suprafete.	Eficacitate: levuricidă, bactericidă. Ca atare, 4-8ml/1m^2	30 secunde
	Eficacitate: micobactericidă, tuberculocidă. Ca atare/ 4-8ml/1m^2	1 minut
	Eficacitate: fungicidă. Ca atare/ 4-8ml/1m^2	90 secunde
	Eficacitate: virucidă generală Ca atare/ 4-8ml/1m^2	2 minute
	Eficacitate virucidă împotriva virusurilor anvelopate Ca atare/ 4-8ml/1m^2	45 secunde

AVIZ Nr. 6330BIO/02/12.30

X. INDICAŢII DE UTILIZARE

Metoda de aplicare	Concentraţia soluţiei de lucru/ doza de aplicare	Timpul de acţiune
Indicații în alte unități decât cele sanitare		
Ștergere suprafețe	Eficacitate: bactericidă, levuricidă, fungicidă, virucidă, micobactericidă, tuberculocidă. Ca atare/ 4-8ml/1m^2	3 minute
Observație: Nu se aplica prin nebulizare		

XI. ETICHETAREA PRODUSULUI BIOCID

Pictograme, simboluri si indicarea pericolului	 GHS07  GHS02 Pericol!
Fraze de pericol (H)	H319 - Provoacă o iritare gravă a ochilor. H225 - Lichid şi vapori foarte inflamabili. H336 - Poate provoca somnolenţă sau ameţeală. H412 - Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
Fraze de precautie (P)	P102 - A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P273 - Evitaţi dispersarea în mediu. P280 - Purtaţi mănuşi de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/ echipament de protecţie a feţei. P304+P340 - ÎN CAZ DE INHALARE: transportaţi victima la aer liber şi menţineţi-o în stare de repaus, într-o poziţie confortabilă pentru respiraţie. P305+P351+P338 - ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi. P370+P378 - În caz de incendiu: A se utiliza stingătorul cu praf ABC pentru a stinge. P403 + P233 - A se depozita într-un spaţiu bine ventilat. Păstraţi recipientul închis etanş. P501 - Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu reglementările privind deșeurile periculoase sau ambalajele și, respectiv, deșeurile de ambalaje.

XII. CATEGORIA DE UTILIZATORI

Profesionali, industriali, populatie

XIII. RECOMANDARI/RESTRICTII PRIVIND PROTECTIA SANATATII SI A FACTORILOR DE MEDIU

-

Avizul este valabil pana la data de 31.12.2030 si a fost rescris in data de 06.08.2026.

Indicatia de utilizare in unitati sanitare este valabila pana la data de 20.04.2028, cu urmatoarele precizari:

[1]Eficacitatea Bactericidă EN 14561:2006, Levuricida EN 13624:2021, Levuricidă/Fungicidă EN 14562:2006, Inactivează virus EN 16777:2018 si Inactivează virus EN 17111:2018 este valabila pana la data de 06.08.2031 (extindere emisa la data de 06.08.2026).

Avizul conţine – 5 pagini.

PREŞEDINTE
Dr. Chim. Gabriela Cilinca



Redactat: Ana-Maria Oancea